

# Het geslacht *Castanea*

## De eetbare Kastanje



Herkomst; ***Castanea sativa*** in de gematigde zône van het Noordelijk Halfrond, in Oost-China, Korea en Mantsjoerrije groeit de ***Castanea mollissima***, in Midden en West-China komt de ***Castanea henryi*** voor, voor Japan is de ***Castanea crenata*** de belangrijkste vruchtdrager, en Noord-Amerika heeft zijn "American Chestnut" de ***Castanea dentata*** in totaal zijn er 11 soorten en een groot aantal cultuurvariëteiten van soorten,

<i>Castanea</i>	x <i>alabamensis</i>	= <i>C. alnifolia</i> x <i>C. dentata</i> , cultuur onbekend
"	<i>alnifolia</i>	Z.O.-Nrd.-Amerika
"	<i>crenata</i>	Japan
"	<i>dentata</i>	Oostel.-Nrd.-Amerika
"	<i>henryi</i>	Oost en Midden China
"	<b><i>mollissima</i></b>	Oost-China, Korea en Mantsjoerrije
"	x <i>neglecta</i>	= <i>C. dentata</i> x <i>C. pumila</i>
"	<i>ozarkensis</i>	Arkansas, Mississipi- vallei, USA
"	<i>pumila</i>	Z.O.-Nrd.-Amerika
"	<b><i>sativa</i></b>	Europa, Klein-Azië en Noord Afrika
"	<i>seguinii</i>	Oost en midden China

Cultuurvormen van de ***Castanea sativa***,  
(syn. *C. vesca*, *C. vulgaris*), In europa bekend als "Edelkastanie" (D), "Sweet Chestnut" (E), "Chataignier" (Fr)

<i>Castanea sativa</i>	<b>'Argenteovariegata'</b>	witbont blad
"	<b>'Asplenifolia'</b>	smal lancetvormig blad
"	<b>'Glabra'</b>	groot sterk glimmend blad
"	<b>'Pendula'</b>	treurvorm
"	<b>'Anny's summer red'</b>	als 'Purpurea'
"	<b>'Purpurea'</b>	als 'Anny's summer red'
"	<b>'Variegata'</b>	geelbont blad
"	<b>'Marron de Lyon'</b>	grote noot, vruchtras
"	<b>'Vincent van Gogh'</b>	dwergvorm, langzame groeier